

SENEVAC[®]

Vacina inativada contra Senecavírus tipo A (cepa SVA-19)

Inativada e homogeneizada em adjuvante aquoso.

USO VETERINÁRIO

Conteúdo: 100 mL (50 doses) ou 200 mL (100 doses).

FÓRMULA:

Cada dose de vacina contém, no mínimo:

Senecavírus Tipo A (cepa SVA-19) 10^{6,0} DICT₅₀*

Adjuvante aquoso à base de ácido poliacrílico.....0,4 mL

Excipiente qsp.....2 mL

* Título mínimo antes da Inativação

INDICAÇÕES:

SENEVAC INATA[®] é indicada para vacinação de leitões sadios (espécie *Sus scrofa domesticus*), na prevenção da infecção causada pelo Senecavírus Tipo A.

MODO DE USAR E DOSE:

AGITAR VIGOROSAMENTE ANTES DE USAR.

A dose indicada por aplicação é de 2 mL / animal. Administrar pela via intramuscular na lateral do pescoço.

Recomenda-se o esquema de vacinação em duas doses de 2 mL cada, com intervalo de 21 dias entre as vacinações:

- 1ª dose aos 40 dias de idade;

- 2ª dose aos 61 dias de idade.

PRECAUÇÕES:

Antes de manusear o produto, atentar-se para a temperatura ideal de utilização, buscando menor desconforto aos animais e facilidade de administração. Ao vacinar um grupo de leitões usar uma caixa de isopor com gelo para manter os frascos de vacina refrigerados (temperatura de conservação: 2°C a 8°C). Retirar da caixa de isopor apenas o frasco de vacina em utilização e atentar para a temperatura ideal para aplicação nos animais: entre 15°C e 25°C.

Agitar bem antes e durante a vacinação.

Desinfetar o local antes da aplicação.

Vacinar somente animais saudáveis.

Utilizar agulhas, seringas e equipamentos estéreis. Para evitar a contaminação da vacina que fica no frasco, o ideal é a utilização de uma agulha por aplicação. Caso não seja possível, recomenda-se a utilização de uma agulha para retirar a vacina do frasco e outras para aplicação nos animais

Após o uso descartar restos de produto e materiais de embalagem de forma adequada, evitando a contaminação do meio ambiente.

Quando administrar o produto, recomenda-se a utilização de luvas. Lavar as mãos após a aplicação do produto.

Aplicar a vacina com calma, seguindo as orientações técnicas, para evitar falhas na vacinação e formação de abscessos no local da aplicação.

ADVERTÊNCIAS:

1. Em caso de autoaplicação acidental, poderá haver uma reação local, que em alguns casos pode ser grave. Neste caso, aconselha-se buscar atendimento médico, levando consigo a embalagem do produto.
2. Manter o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
3. O produto quando administrado de acordo com as recomendações da fabricante não causa reações adversas. Entretanto, reações individuais de hipersensibilidade podem eventualmente ocorrer, nestes casos indica-se o tratamento sintomático

Conservar em temperatura entre 2° C e 8° C e ao abrigo da luz solar direta. Não congelar. Após aberto, o conteúdo do frasco deverá ser completamente utilizado.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.443/2021 em 03/09/2021.
Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco - CRMV-MG nº 19.770.

Proprietário e Fabricante:

Inata Produtos Biológicos Ltda.
Rodovia BR 365, Km 615, s/n°, Bloco D.
38407-180 - Uberlândia - MG
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA